

# القصة



إعداد: أ. صادق كرم

قسم خدمة المجتمع - مركز التدريب



## كيف ينقذ المسعف نفسه

- يجب ان يهدأ المسعف ثم يسعل حتى يخرج الجسم الغريب .
- عند اقرب طاولة او كرسي يقوم المسعف بالضغط على الحافة على الصدر



## الانسداد الكلي ( الغصة ) فاقد الوعي

عند فقدان الوعي نتيجة لتوقف التنفس اتبع الآتي:

- اجعل المصاب مستلقيا على ظهره على سطح صلب.
- اضغط على بطن المصاب.
- افحص فم المصاب.
- اعمل له إنعاش قلبي رئوي مباشرة ( C . P . R )

## انسداد المسلك الهوائية للرضع اقل من سنة

- ضع الرضيع على ذراعك مستندا على فخذك رأسه للأسفل واضرب خمس ضربات على الظهر بين لحي الكتف ( يجب أن يكون الضرب متناسبا مع حجم الرضيع وبقوة مناسبة ).
- اضغط على الصدر فوق عظمة القص أسفل الخط الوهمي بين حلمتي الثدي بإصبعين (تجنب الضغط على البطن).



القصة للأطفال



القصة للرضع



القصة للبالغين



قسم خدمة المجتمع - مركز التدريب  
cheeph66@hotmail.com +965 99841723  
+965 24612382 +965 24612389




Design by dbilife.club  
+965 55059977

# الفصّة

عبارة عن انسداد مفاجئ للممرات الهوائية العلوية بالأجسام الغريبة وغالباً ما تحدث أثناء تناول الطعام.

## العلامات والأعراض

- سعال شديد.
- عدم القدرة على التكلم.
- مسك الرقبة.
- ازرقاق الوجه تدريجي.
- فقدان الوعي بشكل تدريجي.



## الانسداد الجزئي ( الفصّة ) للبالغ والطفل

- في حالة الانسداد الجزئي ( الفصّة ) يمكنك إن
- تسمع صوت التنفس ( صفير ).
- شجع المصاب على السعال (بدلاً من إن يسحب الهواء للداخل) إلى إن يخرخ الجسم الغريب وان لم يخرخ طمأن المصاب واذهب خلف المصاب وضع كلتي يديك على بطن المصاب ثم قوم بالضغط على البطن من الأسفل الى الأعلى إلى إن يخرخ الجسم الغريب.
- قد يتحول الانسداد الجزئي إلى كلي أو يفقد المصاب الوعي.



## الانسداد الكلي ( الفصّة ) للمصاب الواعي البالغ والطفل

- اضغط على بطن المصاب للمساعدة في إخراج الجسم الغريب من المسالك الهوائية.
- مكان الضغط يجب إن يكون بين السرة والغضروف الخنجري.
- قف خلف المصاب ولف ذراعيك حول المصاب.
- ضع قبضة إحدى اليدين على بطن المصاب والأخرى فوقها.
- اضغط للداخل والأعلى.
- لا تضغط على البطن كل من:- الحامل ، الشخص البدين ، الرضيع ( اضغط على الصدر فوق عظمة القص بين حلمتي الثدي ).

